

中文題目：Phenytoin 過敏症候群 – 一病例報告

英文題目：**Phenytoin hypersensitivity syndrome-a case report**

作者：李俊德 許秉毅 黎國洪 羅錦河

服務單位：高雄榮民總醫院內科部胃腸科

前言：

Phenytoin 常被作為癲癇發作的第一線用藥，然而某些報告顯示其藥物過敏性反應高達 19%。若 Phenytoin 過敏的患者同時合併肝臟和皮膚病變，則稱為 Phenytoin 過敏症候群 (**Phenytoin hypersensitivity syndrome**)，但此症在臨床上很少見，主要症狀包含皮疹，發燒及淋巴結腫大，臨床上可能出現白血球增多及嗜酸血球增多症 之情形，同時還會合併急性肝炎。在此，我們提出一個 Phenytoin 過敏症候群病例，並報告其治療經驗。

病例報告：

一位三十歲女性，過去無特別病史，於民國九十三年四月十六日發生交通事故，造成顱內出血及多處挫傷，當日於某市立醫院行緊急顱骨切開術。在住院治療期間，癲癇發作，曾給予 phenytoin 治療。患者於五月八日出院，並持續服用 phenytoin。不幸患者而後出現了發燒，皮疹及黃疸之現象，於是在五月二十三日轉至本院治療，患者剛入院時肝功能嚴重受損，黃疸指數達 15.5 mg/dL，在支持性治療後，病情仍持續惡化，並發生急性腎衰竭及肺衰竭。最後給予血漿置換術及呼吸器治療，同時也投予高劑量類固醇，隨後，其病情逐漸穩定，脫離了呼吸器，同時肝及腎功能也逐漸回復，並於六月十六日出院。

結論：

在 使用 phenytoin 治療患者時，須注意是否發生過敏之情形。若出現 Phenytoin 過敏症候群，可考慮以血漿置換術及類固醇治療。