

【其他】

- (A) 1. 巴金森氏症(Parkinson's Disease)之敘述，何者是錯的？
- A. 早期之症狀是兩側對稱性顫抖(Tremor)，僵硬(Rigidity)為主。
 - B. 大部份病人對 L-Dopa 治療有反應。
 - C. 常合併自律神經障礙，如便秘，胃排空時間延長等症狀。
 - D. 病因為中腦黑核神經細胞之退化與消失。
 - E. 不會合併肌緊張異常(Dystonia)症狀。
- (C) 2. 一位 35 歲女性，近二個月來先有間歇性(intermittent)的頭部鈍痛(dull pain)，後來在用力咳嗽時會加劇痛感。最近則在早上醒來幾個鐘頭內開始有更嚴重的頭痛，位置或在枕部或是整個頭，偶而也併有嘔吐。同時病人也覺得右側肢體有點笨拙，最可能的病因診斷為？
- A. 緊張性頭痛。
 - B. 腦膜炎。
 - C. 顱內腫瘤。
 - D. 顱內動靜脈畸形。
 - E. 偏頭痛。
- (D) 3. 多氯聯苯中毒會產生下列症狀：
- A. 知覺型多發神經病變。
 - B. 胎兒期暴露者，產後小孩期之發育會有大腦認知功能之遲緩。
 - C. Meibomian 腺體有異常之脂分泌物。
 - D. 以上皆是。
 - E. 以上皆非。
- (D) 4. 下列有關重症肌無力(Myasthenia gravis)之描述何者為非？
- A. 約有 10-15%病人伴有胸腺瘤(Thymoma)。
 - B. 老年人較常伴有胸腺瘤。
 - C. 女性較男性多。
 - D. 經常伴有交感神經病變。
 - E. 肌肉萎縮之情況少見。

- (E) 5. 目前對急性原因不明的去髓鞘周邊神經炎(Guillain-Barre syndrome)之嚴重病患，最有效的治療為：
- A. 口服類固醇。
 - B. 靜脈注射類固醇(Intravenous methylprednisolone)
 - C. 抗免疫藥物(Immunosuppressive drugs).
 - D. 大量維他命 B1.
 - E. 靜脈注射免疫球蛋白(Immune globulin)或換血漿術(Plasmapheresis).
- (D) 6. 關於胸腺瘤合併重症肌無力症，下列敘述何者是對的？
- A. 早期胸腺瘤摘除，對重症肌無力症有所改善。
 - B. 病人血液抗骨骼肌抗體(Anti-skeletal muscle antibody)比其他類型重症肌無力症病人高。
 - C. 年齡越高，重症肌無力症病人發現胸腺瘤之機率也越高。
 - D. 以上皆是。
 - E. 以上皆非。
- (B) 7. 缺血性腦中風的人，使用抗凝血劑（如Heparin)要很小心。下面那一項不是使用Heparin 的適應情況(假設頭部電腦斷層並無特殊發現)？
- A. 反覆發生"暫時性腦缺血發作"時。
 - B. 缺血性中風發病後 24 小時內。
 - C. 神經學病徵持續進行中。
 - D. 神經學病徵有明顯的波動現象時。
 - E. 有新的神經學病徵出現時。
- (D) 8. 治療急性腦組織內出血時，下面那一項原則是不對的？
- A. 讓病人安靜休息。
 - B. 尋找出血之原因並加以處理。
 - C. 以 Glycerol 或 Mannitol 控制腦水腫。
 - D. 把血壓控制在收縮壓 140 毫米汞柱以下。
 - E. 避免吸入性肺炎。
- (B) 9. 有關中樞性暈眩的敘述中，何者為非？
- A. 中樞性暈眩為多向性眼震動。
 - B. 可用定點注視來抑制。

- C. 其暈眩的臨床表徵較為輕微。
- D. 垂直型眼震動亦不少見。
- E. 極少有耳鳴及聽力障礙。

(A) 10. 同側暫時性弱視，加上對側上下肢運動困難及感覺缺失，最常見於下列何種疾病？

- A. 內頸動脈疾病(Internal carotid artery disease).
- B. 基底動脈疾病(Vertebrobasilar artery disease).
- C. 中大腦動脈疾病(Middle cerebral artery disease).
- D. 後脈絡動脈疾病(Posterior choroidal artery disease).
- E. 前大腦動脈疾病(Anterior cerebral artery disease).

(C) 11. 那一個疾病不會引起癡呆(Dementia)？

- A. 甲狀腺功能低下症(Hypothyroidism).
- B. 多發性腦梗塞(Multiple cerebral infarctions).
- C. 胰臟炎(Pancreatitis).
- D. 威爾遜症(Wilson's disease).
- E. 酒精癮(Alcoholism).

(B) 12. 與偏頭痛(Migraine)的致病機轉最有關係的神經傳導素(Neurotransmitter)是：

- A. Norepinephrine.
- B. Serotonin.
- C. Dopamine.
- D. Epinephrine.
- E. Acetylcholine.

(D) 13. 請問下列何者是高血壓性腦出血(Hypertensive intracerebral hemorrhage)較少發生的部位？

- A. 視丘(Thalamus).
- B. 殼狀核(Putamen)及附近內囊(Internal capsule).
- C. 橋腦(Pons).
- D. 大腦半球中央白質(Central white matter of hemisphere).
- E. 小腦(Cerebellum).

- (C) 14. 以下有關巴金森氏病的敘述，何者不對？
- A. 顫抖、僵硬、運動緩慢。
 - B. 肌肉不會萎縮。
 - C. 通常為自體隱性遺傳 (Autosomal recessive).
 - D. 有些病例伴有失智症(Dementia).
 - E. 肌腱反射正常。
- (C) 15. 下列除何種藥物外會引起水分聚積？
- A. Cyclophosphamide.
 - B. Chlorpropamide.
 - C. Digoxin.
 - D. Vincristine.
 - E. Indomethacin.
- (A) 16. 重症肌無力(Myasthenia gravis) 病人同時有胸腺腫瘤者佔多少百分比？
- A. 10%.
 - B. 30%.
 - C. 50%.
 - D. 70%.
 - E. 90%.
- (A) 17. 下述諸急性神經學疾病，何者不常直接造成呼吸衰竭？
- A. 被殼出血 (Putaminal hemorrhage).
 - B. 延髓出血 (Medullary hemorrhage).
 - C. 高處頸脊髓外傷 (High cervical cord injury).
 - D. Guillain-Barre syndrome.
 - E. 重症肌無力 (Myasthenia gravis).
- (B) 18. 低血鈉性腦病變之臨床症狀，如躁動(Irritable)，混亂(confusion)，譫妄(delirium)等，其嚴重程度，與下列何者最為有關？
- A. 血中鈉離子濃度愈低者愈嚴重。
 - B. 形成低血鈉之時間（由正常變為低血鈉的時間）愈短者愈嚴重。即急性比慢性嚴重。
 - C. 年齡愈大者愈嚴重。
 - D. 視造成原因(underlying causes) 而定。

E.以上皆是.

(D) 19.大範圍缺血性腦中風 (Large cerebral infarction)所產生的腦水腫以在中風發生後多久為最嚴重?

- A.6 小時之內.
- B.12 小時之內.
- C.12 小時到 24 小時.
- D.24 小時到 72 小時.
- E.3 天到 7 天.

(E) 20.下列何者疾病會引起多發神經病變?

- A.維生素 B12 缺乏.
- B.甲狀腺功能低下症.
- C.糖尿病.
- D.淋巴癌.
- E.以上皆是.

(A) 21.引起 Broca's 失語症的腦部病灶通常在何部位?

- A.Lower posterior frontal area.
- B.Posterior & superior temporal area.
- C.Supramarginal gyrus.
- D.Head of caudate.
- E.Anterolateral thalamus.

(C) 22.下列那種情況腦脊髓液之糖份不會下降?

- A.細菌性腦膜炎.
- B.蜘蛛膜下腔出血.
- C.病毒性腦膜炎.
- D.結核性腦膜炎.
- E.隱球菌性腦膜炎(cryptococcal meningitis).

(C) 23.造成重積癲癇狀態(Generalized status epilepticus)最常見的原因是:

- A.腦瘤.
- B.藥物中毒.
- C.突然停止服用抗癲癇藥物.
- D.電解質不平衡.
- E.腦梗塞.

- (A) 24. 在國內，引起多發性神經病變(Polyneuropathy)，頻率最高的病因為：
- A. 糖尿病.
 - B. 尿毒症.
 - C. 感染後(Postinfectious)，譬如 Guillain-Barre Syndrome.
 - D. 中毒性.
 - E. 癌症性.
- (A) 25. 與週期性麻痺(periodic paralysis)有關之疾病有那些？
- A. 甲狀腺功能亢進 (hyperthyroidism).
 - B. 甲狀腺功能過低 (hypothyroidism).
 - C. 副甲狀腺功能亢進 (hyperparathyroidism).
 - D. 副甲狀腺功能過低 (hypoparathyroidism).
 - E. 以上皆是.
- (C) 26. 急性或亞急性的細菌性心內膜炎病人最常見的神經學併發症為：
- A. 腦膜炎 (Meningitis).
 - B. 蜘蛛膜下腔出血 (SAH).
 - C. 腦栓塞 (Cerebral Embolism).
 - D. 腦出血 (Cerebral Hemorrhage).
 - E. 腦膿瘍 (Brain Abscess).
- (A) 27. 下面那一個部位的腦出血最可能是腦瘤所引起的？
- A. 額葉前端.
 - B. 基底核.
 - C. 視丘.
 - D. 橋腦.
 - E. 小腦.
- (D) 28. 腦中風第一個星期內死亡的最大原因是：
- A. 肺炎.
 - B. 心肌梗塞.
 - C. 敗血症 (sepsis).
 - D. 腦疝脫 (brain herniation).
 - E. 電解質不平衡.

- (D) 29. 一位 30 歲男性覺得在黃昏黑暗時走路會不穩，最可能的病變部位是
- A. 眼睛.
 - B. 小腦.
 - C. 前庭系統.
 - D. 脊髓之 posterior column.
 - E. 脊髓之脊髓視丘徑 (spinothalamic tract).
- (D) 30. 有關 Henoch-Schonlein purpura, 下列何者敘述錯誤？
- A. 是一種 Leukocytoclastic vasculitis.
 - B. 常是 Immune-complex mediated, 病灶常見 IgA 沈積.
 - C. 臨床常見 Palpable purpura.
 - D. 病理可見 Granuloma 形成.
 - E. 常見 Arthralgia, abdominal pain 之症狀.
- (C) 31. 陽光與皮膚之關係，下列何者為非？
- A. 曬傷主要是因紫外線 B.
 - B. 維他命 D 的代謝是經由紫外線 B.
 - C. 長期陽光照射最易引起的皮膚癌為黑色素瘤 (Melanoma)
 - D. 紫外線 B 可影響免疫反應，如降低接觸過敏的反應.
 - E. 癩皮病(Pellagra)具有光敏感性(Photosensitivity).
- (E) 32. Tzanck smear 為一鑑別診斷水 疾病的方法，刮取水 底部之物質，染色後判讀之。如抹片出現巨大表皮細胞 (Giant epithelial cells) 及多核巨大細胞 (Multinucleated giant cells) 應考慮何種疾病？
- A. 尋常性天 瘡 (Pemphigus vulgaris).
 - B. 毒性上皮壞死分解 (Toxic epidermal necrolysis (TEN)).
 - C. 疹樣皮炎 (Dermatitis herpetiformis).
 - D. 多形型紅斑 (Erythema multiforme).
 - E. 帶狀 疹 (Herpes zoster).
- (B) 33. 與乾癬 (Psoriasis) 之臨床表現無關者為：
- A. Koebner 氏現象.
 - B. Raynaud 氏症候群.

- C. Auspitz 現象.
- D. 指甲破壞.
- E. 關節痛.

(C) 34. 下列何者非由瀉過性病毒所引起的疾病：

- A. 尋常疣(Verruca vulgaris).
- B. 扁平疣(Verruca plana).
- C. 扁平濕疣 (Condyloma latum).
- D. 尖圭濕疣 (Condyloma acuminatum).
- E. 傳染性軟疣 (Molluscum contagiosum).

(C) 35. 一個 25 歲男性病人半年來反覆發作口腔及外陰部潰瘍、關節腫痛、皮膚出現毛囊炎及結節性紅斑、血栓性靜脈炎以及眼色素層炎，此病人患有下列何種疾病？

- A. 血管炎.
- B. 紅斑性狼瘡.
- C. Behcet's syndrome.
- D. Stevens-Johnson 症候群.
- E. 天皰瘡.

(E) 36. 不會發生在皮肌炎(Dermatomyositis)之皮膚症狀為何者？

- A. 眼臉紫紅色腫脹(Heliotrope erythema).
- B. 指關節背面扁平隆起性鋪石狀紫色丘疹(Gotttron's sign).
- C. 指甲周圍毛細血管擴張(Periungual telangiectases)
- D. 皮膚異色症(Poikiloderma).
- E. 黑色棘皮症(Acanthosis nigricans).

(E) 37. 下列何者不適合用來治療乾癬：

- A. 紫外線光化學療法(PUVA).
- B. 外用煤焦(Tar) 製劑.
- C. 外用類固醇製劑.
- D. Goeckerman 氏治療法.
- E. 口服類固醇.

(E) 38. 尿毒症(Uremia)導致皮膚劇癢之可能原因為：

- A. Secondary hyperparathyroidism.

B.High skin calcium concentration.

C.Mast cells(肥胖細胞)增生.

D.Xerosis(皮膚乾燥)

E.以上皆是.

(A) 39.腸性肢端皮膚炎(Acrodermatitis enteropathica)常見於中心靜脈營養之病人，其發生與何者之缺乏有關：

A.鋅.

B.銅.

C.維他命 B1.

D.維他命 B2.

E.維他命 B6.

(D) 40.麻疹樣皮疹(Morbilliform eruptions)之可能原因為：

A.德國麻疹(German measles).

B.二期梅毒(Secondary syphilis).

C.藥物反應(Drug reaction).

D.以上皆是.

E.以上皆非.

(A) 41.梅毒病人經治療後，應追蹤檢查下列何者的力價(Titre)?

A.VDRL.

B.TPHA.

C.FTA-ABS.

D.CRP.

E.Microhemagglutination.

(A) 42.下列何者不是慢性砷中毒的特徵？

A.禿髮.

B.手掌、足底出現點狀角化.

C.多發性皮膚癌.

D.內臟癌罹患率增加.

E.色素異常(Rain drop sign).

(D) 43.下列有關於乾癬(Psoriasis)何者不正確？

A.表皮增生.

B.10%的病人有乾癬性關節炎.

C.一般會侵犯頭皮、膝、肘關節.

- D. Methotrexate 為局部性乾癬的選擇藥物.
- E. Cyclosporin 對嚴重或頑固性乾癬有效.

- (C) 44. 有關壞死性遊走性紅斑(Necrolytic migratory erythema)，下列何者是錯誤的？
- A. 常為升糖素瘤(Glucagonoma)的早期表徵.
 - B. 血中胺基酸常降低.
 - C. 因鋅不足引起.
 - D. 皮膚病灶病理變化具特徵性.
 - E. 常以皮疹、口舌炎、體重減輕等來表現.
- (D) 45. 下列有關雌性素(Estrogen)和雄性素(Androgen)的敘述，那一項是正確的？
- A. 雌性素和雄性素皆會促進皮脂(Sebum) 分泌.
 - B. 雌性素和雄性素皆會抑制皮脂分泌.
 - C. 雌性素會促進皮脂分泌，雄性素會抑制皮脂分泌.
 - D. 雌性素會抑制皮脂分泌，雄性素會促進皮脂分泌
 - E. 雌性素和雄性素對皮脂分泌皆無影響.
- (C) 46. 下列何者不是紅斑狼瘡(Lupus erythematosus) 的特徵？
- A. 蝴蝶狀紅斑(Butterfly erythema).
 - B. 直接免疫螢光檢查可見 Immunoglobulin 及 Complement 沈積於表皮之基底膜(Basement membrane zone).
 - C. 於手指關節常見 Gottron 氏丘疹(Gottron's papules).
 - D. 對口服類固醇反應極佳.
 - E. 病人應避免陽光曝曬.
- (B) 47. 在間接螢光免疫檢查(Indirect immunofluorescence test) 中具有表皮細胞間(intercellular) 螢光的是：
- A. 類天皰瘡 (Bullous pemphigoid)
 - B. 天皰瘡 (Pemphigus vulgaris)
 - C. 紅斑性狼瘡(Systemic lupus erythematosus).
 - D. 多形性紅斑(Erythema multiforme)
 - E. 皰疹性皮膚炎(Dermatitis herpetiformis).
- (A) 48. 新生兒紅斑性狼瘡(Neonatal lupus erythematosus)之病童及母親最常出現之抗體為：
- A. 抗 SS-A(Ro) 抗體.

- B. 抗 Sm 抗體.
- C. 抗 Jo-1 抗體.
- D. 抗 Scl-70 抗體.
- E. 抗 SS-B(La) 抗體.

- (E) 49. 紅皮症(erythroderma)可發生於：
- A. 淋巴瘤(Lymphoma).
 - B. 乾癬(Psoriasis).
 - C. 藥物反應(Drug reaction).
 - D. 異位性皮膚炎(Atopic dermatitis).
 - E. 以上皆是.
- (A) 50. 肝斑(Melasma)形成與下列何者無關：
- A. 肝功能不佳.
 - B. 懷孕.
 - C. 口服避孕丸.
 - D. 曝曬陽光.
 - E. 使用化妝品.
- (C) 51. 國人最常見之惡性黑色瘤 (Malignant melanoma)為：
- A. 惡性黑痣黑色瘤 (Malignant lentigo melanoma)
 - B. 表淺擴張性黑色瘤 (Superficial spreading melanoma).
 - C. 肢端黑色瘤 (Acral lentiginous melanoma).
 - D. 結節性黑色瘤 (Nodular melanoma).
 - E. 惡性黑痣 (Lentigo maligna).
- (A) 52. 酒精幻覺症(Alcoholic hallucinosis)與震顫譫妄症(Delirium tremens) 臨床上最大的區別在於前者呈現下列何種特徵？
- A. 意識清楚(Clear sensorium).
 - B. 記憶力喪失(Impaired memory).
 - C. 定向感障礙(Disorientation).
 - D. 視幻覺(Visual hallucination).
 - E. 以上皆非.
- (E) 53. 關於嗎啡成癮者之戒斷症狀，下列何者錯誤？
- A. 嗎啡戒斷症狀約戒斷後八到十六小時出現.

- B. 嗎啡戒斷症狀於第二、三天達到高峰(peak effects).
- C. 嗎啡戒斷症狀五到八天消失，但部份症狀可持續六個月以上.
- D. 通常連續使用一、二週即可成癮.
- E. 急性戒斷症狀的藥物治療，Clonidine 優於 Methadone.

- (C) 54. 下列何種藥物，最不會造成戒斷症狀？
- A. 酒精(Alcohol).
 - B. 安非他命(Amphetamine).
 - C. 強力膠(Glue).
 - D. 鴉片(Opioid).
 - E. Benzodiazepine 類的催眠劑.
- (A) 55. 下列有關厭食症(Anorexia nervosa)的描述，何者為錯誤？
- A. 沒有食慾.
 - B. 儘管體重下降已達營養不良狀態仍拒食.
 - C. 常利用激烈活動減輕體重.
 - D. 患者會出現異常心電圖變化及低血鉀現象.
 - E. 常合併憂鬱現象.
- (C) 56. 三環抗鬱劑(Tricyclic antidepressants) 中毒，下列處理原則何者不適當？
- A. 設法使血液鹼化.
 - B. 洗胃.
 - C. 血液透析.
 - D. 使用 diazepam 控制癲癇發作.
 - E. Propranolol 可用來治療嚴重之竇性心搏過速.
- (E) 57. 下列何者不是抗精神藥物(Anti-psychotic drugs)所常見的副作用？
- A. 惡性症候群(Neuroleptic malignant syndrome).
 - B. 錐體外症狀(Extrapyramidal reactions).
 - C. 抗膽鹼反應(Anticholinergic effects).
 - D. 溢乳—無月經症(Galactorrhea-amenorrhea syndrome).
 - E. 日落症狀(Sundown syndrome).

- (B) 58. 下列藥物何者常用於嗎啡戒斷(Morphine withdrawal) 的治療？
- A. Diazepam (Valium).
 - B. Clonidine (Catapres).
 - C. Haloperidol (Haldol).
 - D. Phenobarbital (Luminal).
 - E. Imipramine (Tofranil).
- (C) 59. 某位 25 歲少婦因事與丈夫口角，在劇烈爭吵過後突然說不出話來，只能比手劃腳像啞吧般，她本人好像不在乎的樣子，經過檢查後沒有異常的身體毛病，她可能罹患何種疾病？
- A. 精神分裂病(Schizophrenia).
 - B. 廣泛性焦慮症(Generalized anxiety disorder).
 - C. 轉化症(Conversion disorder).
 - D. 強迫症(Obsessive compulsive disorder).
 - E. 解離症(Dissociation disorder).
- (B) 60. 下列何者是譫妄(delirium)症的主要症狀或診斷根據？
- A. 失眠.
 - B. 注意力障礙.
 - C. 暴亂行爲.
 - D. 激動不安.
 - E. 大腦萎縮.
- (C) 61. 65 歲男性，患有嚴重慢性阻塞性呼吸道疾病，同時主訴有嚴重的焦慮症狀，最適當的精神藥物處方為：
- A. Alprazolam (Xanax).
 - B. Carbamazepine (Tegretal).
 - C. Buspirone (Buspar).
 - D. Fluoxetine (Prozac).
 - E. Lorazepam (Ativan).
- (C) 62. 下列精神科用藥，何者在懷孕時服用最易導致胎兒器官之異常發展？
- A. Haloperidol.
 - B. Chlorpromazine.

- C.Lithium.
- D.Lorazepam.
- E.Carbamazepine.

- (C) 63. 老年人最常見的痴呆症為
- A. 多發梗塞性痴呆.
 - B. 維他命缺乏引起之痴呆.
 - C. Alzheimer 型老年期痴呆.
 - D. 巴金森氏病合併痴呆.
 - E. 腦瘤引起之痴呆.
- (E) 64. 痴呆症(Dementia)必需與下列何種疾病鑑別診斷？
- A. 憂鬱症(Depression).
 - B. 譫妄(Delirium).
 - C. 心因性失憶症(Psychogenic amnesia).
 - D. 藥物慢性中毒引起之意識混淆(Drug-induced confusion).
 - E. 以上皆是.
- (E) 65. 下列痴呆症成因，何者是可治療的(treatable)？
- A. 正常壓水腦症(Normal pressure hydrocephalus, NPH).
 - B. 維他命 B12 缺乏症(Vit B12 deficiency).
 - C. 硬腦膜下血腫(Subdural hematoma).
 - D. 甲狀腺機能過高(Hyperthyroidism).
 - E. 以上皆是(all of the above).
- (A) 66. 嗎啡戒斷脫癮(Morphine withdrawal)可呈現下列症狀，何者除外？
- A. 瞳孔縮小(Constricted pupil).
 - B. 流鼻涕(Rhinorrhea).
 - C. 打哈欠(Yawning).
 - D. 腹瀉(Diarrhea).
 - E. 顫抖(Tremor).
- (D) 67. 下列疾病，皮膚會出現紫斑，那一項除外？
- A. Amyloidosis.
 - B. Ehlers-Danlos syndrome.

- C.Meningococemia.
- D.Lupus vulgaris.
- E.Vasculitis.

(B) 68.長期使用下列藥物容易導致憂鬱症狀，何者除外？

- A.Beta blockers.
- B.Benzodiazepine.
- C.Reserpine.
- D.Methyldopa.
- E.Levodopa.

(E) 69.母親酗酒，可能生下胎兒酒精症候群(Fetal alcohol syndrome)，其主要特徵是：

- A.臉部畸型(Facial abnormality).
- B.低智能(Low intelligence).
- C.個子低小(Small stature).
- D.出生時體重不足(Low birth weight).
- E.以上皆是.

(D) 70.某位 20 歲大學女生曾在一年多以前被歹徒強暴，最近半年以來時常睡不著，焦躁不安，見到陌生男子靠近就會感到莫名其妙的緊張害怕，渾身發抖，甚至會尖叫不已，並且常在半夜驚醒，彷彿又回到被強暴的情景。她可能罹患：

- A.廣泛性焦慮症(Generalized anxiety disorder).
- B.恐慌症(Panic disorder).
- C.社交性恐懼症(Social phobia).
- D.創傷後壓力性疾患(Post-traumatic stress disorder).
- E.精神分裂症(schizophrenia).

(E) 71.關於憂鬱症，下列敘述何者錯誤？

- A.第一次發作的年齡，最常發生於 20-40 歲.
- B.約有五分之一的患者以後發生躁症(Manic episode).
- C.患者就醫初期常主訴身體症狀，很少提及或否認有憂鬱情緒.
- D.約有 25%的輕度憂鬱症(Dysthymia)患者會併發重度憂鬱症(Major depression).
- E.若未經治療，每次重度憂鬱症發作的平均時間約為 3

個月。

- (E) 72. 24 歲的男性個案主訴無緣無故會突然焦慮發作，同時併有心悸，頭暈、胸痛、噁心等症狀；平均每週發作一次，已發作了十幾次，詳細的身體檢查與理學或實驗室檢查結果均正常，下列這些藥物可用來治療發作，何者除外？
- A. 抗焦慮劑(Antianxiety drugs).
 - B. 抗精神病劑(Antipsychotics).
 - C. 三環抗鬱劑(Antidepressants).
 - D. 單胺氧化酵素抑制劑(Monoamine oxidase inhibitors)
 - E. 鋰鹽(Lithium).
- (C) 73. 下列症狀,那一項不出現於椎-基底動脈機能不全之病人
- A. 肢體感覺異常(paresthesia)
 - B. 肢體輕癱(paresis)
 - C. 一時性黑矇(amaurosis fugax)
 - D. 墜發作(drop attack)
 - E. 暈眩(vertigo)
- (D) 74. 18 歲年輕男性,最近三天突發作急性妄想性精神病,送到急診室,經詢問病史有吸毒史,其最可能的使用毒品為:
- A. 大麻
 - B. 強力膠
 - C. 速賜康
 - D. 安非他命
 - E. 海洛英
- (E) 75. 接受單胺氧化酵素抑制劑藥物 (monoamine oxidase inhibitors)治療的病人應該避免吃有何種成分的食物?
- A. cholesterol
 - B. choline
 - C. lactose
 - D. tryptophan
 - E. tyramine
- (D) 76. 絕症臨終(Dying patients)病患常經歷心理適應階段,從否認、氣憤、求償、憂鬱、到接納,其最常用的心理防衛機轉是:

- A. 否認作用(denial)
- B. 依賴作用(dependency)
- C. 轉移作用(displacement)
- D. 全是(all of above)
- E. 全非(none of above)

(B) 77. 中國有句<此地無銀三百兩>俗話,它在心理防衛機轉(defense mechanism)是屬於下列何種作用?

- A. 潛抑作用(repression)
- B. 反向作用(reaction formation)
- C. 投射作用(projection)
- D. 否定作用(denial)
- E. 移情作用(displacement)

(C) 78. 服用過量三環抗鬱劑如 amitriptyline ,可能有下列副作用,何者為非?

- A. 發燒(pyrexia)
- B. 口乾(dry mouth)
- C. 瞳孔縮小(constricted pupils)
- D. 小便困難(retention of urine)
- E. 譫妄(delirium)

(E) 79. 關於恐慌症(panic disorder),近年來頗受矚目,美國估計有 1-2%的人為此病症所困擾,患者在恐慌發作時,常跑到急診求醫,也常在各醫院心臟科,胸腔科求診,有關此症之敘述,下列何者正確?

- A. 恐慌發作(panic attack)大多是由於憤怒、擔心、或心理困擾所引發
- B. 恐慌症患者,在病前多有酗酒的習慣
- C. 有歇斯底里性(hysterical)人格者,較易罹患此症
- D. 多數恐慌症患者害怕待在家中,較喜歡人多的場所較有安全感
- E. 有些恐慌症患者併有懼曠症(agoraphobia),畏懼密閉的地方如電梯間,電影院,或不敢搭乘封閉的交通工具如飛機。

(C) 80. 下列有關恐慌症(panic disorder)之敘述,何者為錯誤?

- A. 三環抗鬱劑可有效治療恐慌之發作。
- B. 抗焦慮劑可以治療患者之預期焦慮 (anticipatory

anxiety)。

C. 僧帽瓣脫垂(mitral valve prolapse)是恐慌症最常見的原因。

D. 恐慌症發作通常是陣發性。

E. 恐慌症發作並非重大之心理壓力所導致。

(B) 81. 在患有肝臟功能障礙的病人,若你需用抗焦劑(Anxiolytics),你認為最好是選下列何種藥物?

A. Diazepam

B. Lorazepam

C. Clonazepam

D. Flurazepam

E. Chlordiazepoxide

(D) 82. 服用 Chlorpromazine 過量,可導致低血壓(Hypotension),如需治療,下列藥物何者是禁忌?

A. Phenylephrine hydrochloride

B. Ephedrine

C. IV fluid replacement

D. Epinephrine

E. Dopamine

(C) 83. 抗精神病劑惡性症候群(Neuroleptic Malignant Syndrome, NMS)為抗精神藥物引起死亡率較高的一種副作用,有關於 NMS 之臨床表徵,何者為不正確?

A. 肌肉僵直(muscle rigidity)

B. 急性腎衰竭(acute renal failure)

C. 低體溫(hypothermia)

D. 白血球增高(leukocytosis)

E. Creatine phosphokinase 的增高

(D) 84. 一位 30 歲的女性病人,自從半年前接受子宮切除後,腹部傷口一直無法癒合;後來醫護人員發現每次醫師一向病人宣佈傷口快癒合,可準備出院後,病人會趁醫護人員不注意時,故意又將傷口弄破,請問下列那一診斷最符合病人的情況?

A. 焦慮症(anxiety state)

B. 憂鬱症(depressive disorder)

- C. 慮病症(hypochondriasis)
- D. 佯病症(factitious disorder)
- E. 轉化症(conversion disorder)

(E) 85. 下列那項描述不是 A 型行爲(Type A behavior)的特徵?

- A. 容易動怒
- B. 時間逼迫感
- C. 競爭心
- D. 愛挑剔
- E. 講話繞圈子

(C) 86. 藥物濫用的問題越來越嚴重,嗎啡癮 (Morphine addiction)的戒斷脫癮(Withdrawal)狀況如下列,何者除外?

- A. 流冷汗(Sweating)
- B. 流鼻涕(Rhinorrhea)
- C. 瞳孔縮小(Constricted pupils)
- D. 打哈欠(Yawning)
- E. 下腹抽痛(Abdominal cramps)

(D) 87. 結核性腦膜炎或合併腦炎可能出現下列那些合併症:

- A. 癲癇性痙攣
- B. 血管性發炎造成之腦梗塞
- C. 顱內壓上昇
- D. 以上皆是
- E. 以上皆非

(D) 88. 腦血管阻塞之病人中,若有眩暈,複視,偏癱及周圍性顏面神經麻痺等表徵,則其病變可能在:

- A. 大腦
- B. 小腦
- C. 中腦
- D. 橋腦
- E. 延髓

(D) 89. 下列有關 Gerstmann's Syndrome 的描述何者爲非?

- A. 左右側肢體混淆(Confusion of right and left limbs)
- B. 對手指辨識不能(Finger Agnosia)

- C. 計算能力不能(Acalculia)
- D. 穿衣不能(Dressing Apraxia)
- E. 書寫不能(Agraphia)

(D) 90. 有關慢性砷中毒(Chronic arsenism)的敘述何者正確?

- A. 發生膀胱癌, 腎癌及肝癌的危險性較高。
- B. 皮膚常有 Bowen's disease 及 arsenic keratosis
- C. 皮膚有色素增加(hyperpigmentation)的表現
- D. 以上皆是
- E. 以上皆非

(C) 91. Behcet's disease 之臨床表徵如下, 何者為非?

- A. 陰部潰瘍
- B. 虹膜炎(Iritis)
- C. 變形性關節炎(Deforming arthritis)
- D. 血管炎或結節性紅斑
- E. 口瘡性口炎

(D) 92. 最常見引起接觸性皮膚炎的金屬為:

- A. 鉻(Chromium)
- B. 銅(Copper)
- C. 金(Gold)
- D. 鎳(Nickel)
- E. 鈷(Cobalt)

(E) 93. 白斑病患發生下列那些疾病機會升高?

- A. 甲狀腺疾病
- B. 愛迪生氏症(Addison's disease)
- C. 糖尿病
- D. A+C
- E. A+B+C

(B) 94. Acanthosis nigricans 可能是內臟性腫瘤的一種表徵, 其中最常見的惡性腫瘤是來自:

- A. 呼吸道
- B. 消化道
- C. 肝臟
- D. 造血系

E. 泌尿道

- (E) 95. 有關神經纖維瘤病 Neurofibromatosis (NF) 之陳述, 何者為對?
- A. NF-2 (第二型) 者會有 Acoustic neuroma
 - B. 皮膚出現 Cafe-au-lait spots
 - C. 中樞神經 (CNS) 腫瘤如 Meningioma
 - D. 眼睛 Iris 出現 Lisch nodule.
 - E. 以上皆是
- (C) 96. 有關 Hereditary hemorrhagic telangiectasia 那項不是其表現?
- A. Recurrent epistaxis
 - B. Gastrointestinal bleeding
 - C. Periungual telangiectasia
 - D. Arteriovenous malformation of dermal microvasculature
 - E. Pulmonary A-V fistula
- (B) 97. 以下那一種良性腫瘤與皮膚老化有關?
- A. 平滑肌瘤 (Leiomyoma)
 - B. 櫻桃血管瘤 (Cherry angioma)
 - C. 球狀腫瘤 (Glomus Tumor)
 - D. 血管脂肪瘤 (Angiolipoma)
 - E. 神經鞘瘤 (Neurilemmoma)
- (E) 98. 有一 25 歲女性病人罹患一塊突發性 5 公分大且境界鮮明之紅斑, 表面糠狀細鱗屑, 再過一週後, 突然發生多發性紅斑於軀幹, 然後向四肢發生新病灶。皮疹均為淡紅色橢圓形邊緣呈鋸齒狀脫屑, 境界鮮明之紅斑, 且於背上呈樅樹 (Fir-tree) 狀排列。最可能的診斷為:
- A. 汗斑 (花斑癬) (Tinea versicolor)
 - B. 尋常性乾癬 (Psoriasis vulgaris)
 - C. 體癬 (Tinea corporis)
 - D. 脂漏性皮膚炎 (Seborrheic dermatitis)
 - E. 玫瑰糠疹 (Pityriasis rosea)
- (C) 99. 下列對 TEN (Toxic epidermal necrolysis) 及 SSSS (Staphy

-lococcal scalded skin syndrome)的敘述何者正確?

- A.SSSS 好發於老年人
- B.TEN 是由 staphylococcus 釋放的 exfoliatin 所引起
- C.兩者的 Nikolsky's sign 均為陽性反應
- D.SSSS 可以形成大面積的 tense bullae
- E.以上皆非

(C) 100. 下列有關色素失調症(Incontinentia pigmenti)的敘述何者為非?

- A.遺傳型式為 X 染色體相關性顯性遺傳
- B.嬰兒時期的皮膚病灶為線狀排列的水 及疣狀丘疹
- C.大部分患者的皮膚病灶在成年後開始出現
- D.部分患者可能合併有智障、痙攣、斜視等先天缺陷
- E.皮膚切片可見到真皮的巨噬細胞內有色素

(E) 101. 下列皮膚疾病,何者呈現表皮下水 (subepidermal blister)

- A.Bullous impetigo
- B.Herpes simplex
- C.Herpes zoster
- D.Contact dermatitis
- E.Bullous pemphigoid

(B) 102. 與 Rheumatic fever 有關之皮疹為

- A.Erythema multiforme
- B.Erythema marginatum
- C.Erythema induratum
- D.Erythema nodosum
- E.Erythema chronicum migrans

(B) 103. 下列何種藥物較不會引起光敏感(photosensitivity)?

- A.Tetracycline
- B.Penicillin
- C.Griseofulvin
- D.Phenothiazines
- E.Tolbutamide

(B) 104. 下列那種水 病會在直接螢光病理檢查(Direct immuno

-pathology)出現 intercellular IgG 沈澱?

- A.Toxic epidermal necrolysis(TEN)
- B.Pemphigus vulgaris
- C.Bullous pemphigoid
- D.Dermatitis herpetiformis
- E.Epidermolysis bullosa acquisita

(D) 105.引起紅皮症(Erythroderma)的原因很多,惡性腫瘤是其中之一,下列何者是最常見引起紅皮症的惡性腫瘤?

- A.肺癌
- B.惡性黑色素瘤(Malignant melanoma)
- C.非霍寄金氏淋巴瘤(Non-Hodgkin's lymphoma)
- D.T 淋巴細胞性淋巴瘤(Cutaneous T-cell lymphoma)
- E.攝護腺癌(Prostatic cancer)

(A) 106.在 KOH preparation 看到 pseudohyphae 及 budding spore ,你的診斷是?

- A.Candidal infection
- B.Chromomycosis
- C.Dermatophyte infection
- D.Atypical mycobacterial infection
- E.Herpes simplex infection

(D) 107.以下何種疾患不會發生痤瘡樣皮疹(Acneiform eruption) ?

- A.尋常性痤瘡(Acne vulgaris)
- B.散播性囊球菌症(Disseminated cryptococcosis)
- C.多囊腫卵巢病(Polycystic ovary disease)
- D.硬皮症(Morphea)
- E.克興氏病(Cushing's disease)

(D) 108.全身性皮膚搔癢與下列何者系統疾病無關?

- A.蕈樣真菌病(Mycosis fungoides)
- B.甲狀腺機能減退(Hypothyroidism)
- C.甲狀腺毒症(Thyrotoxicosis)
- D.血脂過少症(Hypolipemia)
- E.缺鐵性貧血(iron deficiency anemia)

- (E) 109. 下列何種疾病可引起紅皮症(erythroderma)?
- A. 脂漏性濕疹
 - B. 淋巴癌
 - C. 乾癬
 - D. 藥物疹
 - E. 以上皆是
- (E) 110. Alopecia(禿髮)之原因, 下列何者不是:
- A. Secondary syphilis
 - B. Tinea capitis
 - C. Lupus erythematosus
 - D. Hypothyroidism
 - E. Psoriasis
- (D) 111. 下列有關重症肌無力的描述何者為非?
- A. 好發於女性
 - B. 早期易先以侵犯眼部肌肉開始
 - C. 與自體免疫系統異常, 產生特異性 Anti-Acetylcholine Receptor 抗體有密切關係
 - D. 與肉毒桿菌中毒的致病機轉相同
 - E. 神經重複性刺激檢查(Repetitive Stimulation Test) 有助於診斷
- (A) 112. 與週期性麻痺(Periodic Paralysis)有關的是何種疾病?
- A. 甲狀腺功能亢進症(Hyperthyroidism)
 - B. 甲狀腺功能低下(Hypothyroidism)
 - C. 副甲狀腺功能亢進症(Hyperparathyroidism)
 - D. 副甲狀腺功能低下(Hypoparathyroidism)
 - E. 以上皆非
- (B) 113. 下列何者, 不是威爾遜症(Wilson's disease)常見的臨床表徵?
- A. 癡呆(Dementia)
 - B. 癲癇發作(Seizures)
 - C. 肝硬化(Liver cirrhosis)
 - D. 手抖顫(Hand tremor)
 - E. Kayser-Fleischer ring

(B) 114. Phenytoin 急性中毒時,可出現下列之徵候,只有一項例外,該項例外是:

- A. 心律不整
- B. 週邊神經病變
- C. 眼震
- D. 意識障礙
- E. 步態不穩

(C) 115. 下列那種情況腦脊髓液之糖份不會下降?

- A. 細菌性腦膜炎
- B. 蜘蛛膜下腔出血
- C. 病毒性腦膜炎
- D. 結核性腦膜炎
- E. 隱球菌性腦膜炎(cryptococcal meningitis)

(A) 116. 昏迷患者之眼球共軛(Conjugate)或不共軛的緩慢轉來、轉去、漂動不定(roving eye movements),該現象表示:

- A. 大腦瀰漫性損壞,但腦幹功能完整
- B. 視丘病灶
- C. 中腦病灶
- D. 橋腦病灶
- E. 延腦病灶

(A) 117. 下面那一個部位的腦內出血,最可能是腫瘤所引起的?

- A. 額葉前端
- B. 基底核
- C. 視丘
- D. 橋腦
- E. 小腦

(A) 118. Alzheimer 氏病(Alzheimer's disease)之主要智能減退症狀為:

- A. 記憶力差(memory impairment)
- B. 失語症(aphasia)
- C. 失用症(apraxia)
- D. 不識症(agnosia)
- E. 計算不能(acalculia)

- (A) 119. 帕金森氏症(Parkinsonism)之主要病理變化特徵為 "neuronal loss and depigmentation" 發生於:
- A. 黑質(Substantia nigra)
 - B. 大腦皮質(Cerebral cortex)
 - C. 小腦(Cerebellum)
 - D. 基底神經節(Basal ganglion)
 - E. 脊髓(Spinal cord)
- (C) 120. 一位癲癇病患在長期服用抗癲癇藥物 Carbamazepine, 當他必要使用抗生素時, 由於藥物相互作用的關係, 應避免或小心使用下列何種藥物, 以免發生 Carbamazepine 急性中毒:
- A. Aminoglycosides
 - B. Chloramphenicol
 - C. Erythromycin
 - D. Penicillin
 - E. Tetracycline
- (A) 121. 產生眩暈(Vertigo)症狀最為輕微的情況是:
- A. 聽神經瘤(Acoustic neuroma)
 - B. 急性周邊迷路病變(Acute peripheral vestibulopathy)
 - C. 良性陣發姿勢性眩暈(Benign paroxysmal positional vertigo)
 - D. 美悠尼氏症(Meniere's disease)
 - E. Wallenberg 症候群
- (B) 122. 有關腦內出血(ICH)之治療, 下面那一項是錯的?
- A. 應囑病人安靜臥床休息
 - B. 收縮期血壓應控制在 140 毫米汞柱左右
 - C. 應抽血檢查是否有出血傾向
 - D. 應使用 Glycerol 或 Mannitol 控制腦壓
 - E. 應小心避免吸入性肺炎之發生
- (A) 123. 五十歲男性, 就診前一天早上起床發現複視、噁心、嘔吐、構音吞嚥困難, 休息半天後發現全身無力無法下床。理學檢查發病人意識清楚, 瞳孔對光反射不良。病人有可能診斷為:
- A. 肉毒中毒

- B. Guillain-Barre 症候群
- C. 低鉀性週期麻痺
- D. 腦幹中風
- E. 重症肌無力

(A) 124. 下列那一項非屬於典型性偏頭痛(Classic Migraine) 發作時之前驅症狀(Aura)?

- A. 雙顳側偏盲(Bitemporal hemianopsia)
- B. 同側偏盲(Homonymous Hemianopsia)
- C. 單側偏癱(Hemiparesis)
- D. 眼肌癱瘓(Ophthalmoplegia)
- E. 閃爍暗點(Scintillating scotoma)

(A) 125. 下列何者為多發性硬化症(multiple sclerosis) 最常見之初期症狀:

- A. 無力
- B. 感覺異常
- C. 視力喪失
- D. 不協調
- E. 昏眩

(D) 126. 梅尼爾氏(Meniere's disease) 病之臨床表徵不包括:

- A. 眩暈
- B. 耳鳴
- C. 失聰
- D. 複視
- E. 嘔吐

(D) 127. 在急性腦缺血梗塞之早期, 小量使用 Glycerol 或 Mannitol 的好處為何?

- A. 減少過高之腦壓
- B. 供給腦神經營養
- C. 改善血液黏稠度
- D. 減少局部腦腫, 改善側枝循環
- E. 擴張血量

(E) 128. 關於治療恐慌症(Panic disorder)急性發作, 下列藥物何者不適當?

- A. Imipramine(Tofranil)
- B. Phenelzine
- C. Alprazolam(Xanax)
- D. Propranolol(Inderal)
- E. Buspirone(Buspar)

(B) 129. 酒癮患者特別需要補充何種維生素

- A. 維生素 A
- B. 維生素 B
- C. 維生素 C
- D. 維生素 D
- E. 維生素 E

(D) 130. 在常濫用的藥物中,何者可造成戒斷譫妄狀態(Withdrawal delirium)?

- A. 安非他命(amphetamine)
- B. 海洛英(heroin)
- C. 大麻屬(cannabis)
- D. 酒精(alcohol)
- E. 以上皆是

(A) 131. 下列何種物質濫用較不會產生脫癮症候群(Withdrawal syndrome)?

- A. 幻覺劑(hallucinogens)如 LSD
- B. 鎮靜及抗焦慮藥物(sedative-anxiolytics)
- C. 安非他命(amphetamine)
- D. 咖啡因(caffeine)
- E. 尼古丁(nicotine)

(D) 132. 譫妄症(Delirium)在內外科病房中約有 5-15%,其主要症狀呈現意識障礙,注意力缺損和紊亂行爲,可能致病因素如下列,何者除外?

- A. 腦炎(encephalitis)
- B. 低血糖(hypoglycemia)
- C. 酒癮戒斷(alcohol withdrawal)
- D. 抗鬱劑如 Amitriptyline 戒斷
- E. 安眠藥過量(hypnotic effects)

- (D) 133. 住院之身體疾病病人突然發生譫妄症(Delirium)時,下列那項處理正確?
- A. 迅速以巴比妥鹽類藥劑予以鎮靜
 - B. 激動時應予身體約束
 - C. 儘量把房間弄暗,並保持肅靜
 - D. 照顧者儘量固定同一人,並避免轉換病房
 - E. 儘早轉至精神科病房接受治療
- (D) 134. 下列那一項是鋰鹽(Lithium carbonate)治療的禁忌?
- A. 糖尿病
 - B. 肝硬化
 - C. 青光眼
 - D. 腎功能障礙
 - E. 甲狀腺機能亢進
- (B) 135. 錐體外症狀(Extrapyramidal reaction)是下列何種藥物所造成的副作用?
- A. Benzodiazepine
 - B. Antipsychotics
 - C. Antidepressant
 - D. Anticonvulsant
 - E. Stimulant
- (E) 136. 皮膚的血液循環及汗腺對體溫的調節有很大作用,每克(Gram)的水由皮膚蒸發會消耗多少能量?
- A. 180 卡路里(calories)
 - B. 280 卡路里
 - C. 380 卡路里
 - D. 480 卡路里
 - E. 580 卡路里
- (D) 137. 下列何者非自體免疫性皮膚水 病?
- A. 尋常性天 瘡(pemphigus vulgaris)
 - B. 落葉性天 瘡(pemphigus foliaceus)
 - C. 類天 瘡(Bullous pemphigoid)
 - D. 家族性良性天 瘡(Benign familial pemphigus)
 - E. 增殖性天 瘡(pemphigus vegetans)

- (B) 138. 有關結節癩(tuberculoid leprosy)的敘述中,請問何者為是?
- A. 皮膚病變上的知覺如常
 - B. 病灶細菌檢查常是陰性
 - C. 病灶呈全身性的分佈
 - D. Lepromin test 呈陰性
 - E.
- (E) 139. 典型的尋常性乾癬(psoriasis vulgaris)之組織病理所見:
- A. 表皮的網脊(Rete Ridge)之變長(elongation)
 - B. 角質(Keratin)之不全角化(Parakeratosis)
 - C. 表皮內之白血球集合
 - D. 真皮之毛細血管擴張
 - E. 以上皆是
- (D) 140. 在諸多職業病中,最常見的是皮膚病。下列有關職業性皮膚病的敘述中何者為非?
- A. 皮膚病變多以濕疹型態出現
 - B. 發病的部位多是在手上
 - C. 貼膚測試(Patch test)可鑑定接觸過敏原
 - D. 治療及預防之道是換工作
 - E.
- (A) 141. 一、兩個直徑約數公分的圓形褐色斑,多在四肢、陰部或臉部,可數月或數年之久,請問最可能的診斷是
- A. 固定性藥疹 Fixed drug reaction
 - B. 色素性母斑 Nevus pigmentosus
 - C. 紅斑性狼瘡 Lupus erythematosus
 - D. 天 瘡 Pemphigus vulgaris
 - E.
- (D) 142. 以下何種皮膚病變為原發性(Primary)病變?
- A. 斑(Macule),丘疹(Papule),癍痕(Scar),結節(Nodule)
 - B. 水 (Vesicle),丘疹(Papule),癍痕(Scar),大水 (Bulla)
 - C. 斑(Macule),腫瘤(Tumor),癍痕(Scar),水 (Vesicle)
 - D. 丘疹(Papule),水 (Vesicle),斑(Macule),大水

(Bulla)

E. 癩痕(Scar), 囊腫(Cyst), 斑(Macule), 水 (Vesicle)

(B) 143. 由藥物所致皮膚反應形態繁雜, 下列所述何者為非?

- A. 最常見的是蕁麻疹
- B. 發病的機轉大部份是免疫性
- C. 如果用藥中止, 則皮膚反應隨即減輕
- D. 皮膚測試反應是陰性也無法排除是由 IgE 相關所致
- E.

(B) 144. 男性 55 歲, 於上臂外側出現一約三公分直徑之青褐色斑, 歷時兩年, 感冒時會變得潮紅, 最可能的診斷是?

- A. 玫瑰糠疹 Pityriasis rosea
- B. 固定性藥疹 Fixed drug eruption
- C. 色素性母斑 Nevus pigmentosus
- D. 變色糠疹 Tinea Versicolor
- E.

(D) 145. 由長期的日光暴露所引發的皮膚老化, 下列所述中, 請問何者為是?

- A. 真皮結締組織變性 Elastosis
- B. 汗腺及皮脂腺(Eccrine glands and Sebaceous glands) 數目減少
- C. 皮膚惡性腫瘤
- D. 以上皆是
- E.

(C) 146. 疹樣皮膚炎(Dermatitis herpetiformis)之特徵:

- A. 表皮內之水
- B. 甚少搔癢
- C. 正常及病變處表皮基底膜處(Basement membrane zone)可有 IgA 沉著
- D. 麩質(Gluten)過敏甚少
- E. 特定的 HLA 患者並不多見

(E) 147. Ramsay Hunt syndrome 與下列何種 Virus 的感染有關?

- A. Epstein-Barr Virus (E-B virus)
- B. Herpes simplex type I

- C. Herpes simplex type II
- D. Cytomegalovirus
- E. Zoster-varicella virus

(D) 148. 下列皮膚疾病何者病理呈現表皮內水 (intraepidermal blister)?

- A. Bullous pemphigoid
- B. Herpes gestationis
- C. Diabetic bulla
- D. Herpes viral infection
- E. Porphyria cutanea tarda

(C) 149. 下列有關皮肌炎(Dermatomyositis)的敘述何者為非?

- A. 最常見的皮膚表徵是上眼瞼出現紫紅色腫脹變化
- B. 指關節背側, 手肘等處出現紫色丘疹稱為 Gottron's papules
- C. 皮膚切片的直接免疫螢光反應通常為陽性
- D. 患者最好避免日曬, 平時應塗抹防曬品保護
- E. 成人皮肌炎患者合併惡性腫瘤者, 以鼻咽癌居首位

(B) 150. 關於 疹病毒感染(HSV infection)之敘述, 下列何者為真

- A. HSV 為一 RNA 病毒
- B. 水 細胞診對早期診斷 HSV 感染有幫助
- C. 水 細胞診若發現有多核巨細胞, 則可確定為 HSV 感染
- D. 陰部 疹主要是由 HSV-type I 所引起
- E. 以上皆是

(A) 151. 有關 Tuberous Sclerosis 下列何者不對?

- A. Dominant mutant gene in chromosome 22
- B. Shagreen patch
- C. Angiofibroma
- D. Angioleiomyoma of kidneys
- E. Calcified nodules in brain subependymal regions

(C) 152. Darier 氏徵象(Darier's sign)陽性出現於下列何疾?

- A. 色素性乾皮症(Xeroderma pigmentosum)
- B. 青年黃色肉芽腫(Juvenile Xanthogranuloma)
- C. 色素性蕁麻疹(Urticaria pigmentosa)

- D. 色素失調症(Incontinentia pigmenti)
- E. 多形性紅斑(Erythema multiforme)

(D) 153. 關於壓迫皮膚檢視法(Diascopy), 何者為非?

- A. 其方法是以透明玻璃片壓現皮膚病變
- B. 可藉此將血管內血液壓除, 觀察色調之變化
- C. 紅斑時, 其紅色會因此消失
- D. 紫斑時, 其紫色會因此消失
- E. 黑斑時, 其黑褐色不會因此消失

(C) 154. 下列有關水 性類天 瘡(Bullous pemphigoid)的敘述, 何者為非?

- A. 好發於老年人, 為表皮下水 疾病
- B. 皮膚病灶常見於下腹部, 腹股溝及四肢屈側
- C. 約有百分之八十的患者有口腔粘膜病灶
- D. 皮膚切片的直接免疫螢光反應為基底細胞層有帶狀免疫球蛋白及補體的沈積
- E. 治療以皮質類固醇為主, 有時可併用免疫抑制劑控制之

(D) 155. Griseofulvin 用以治療頭癬(Tinea capitis)之妥善劑量及期間為:

- A. 250mg bid × 1 week
- B. 250mg bid × 2 weeks
- C. 500mg qd × 1 week
- D. 500mg bid × 4~6 weeks
- E. 500mg bid × 6 months

(A) 156. 乾癬性關節炎最常見之關節病變為下列那一種?

- A. 不對稱性少關節性關節炎(Asymmetric oligoarticular arthritis)
- B. 對稱性多關節性關節炎(Symmetric polyarthritis)
- C. 遠端指關節炎(Distal interphalangeal joint)
- D. Arthritis mutilans
- E. 僵直性脊椎關節炎(Ankylosing spondylitis)

(C) 157. 臨床上皮膚脆弱產生香煙紙樣的疤痕(cigarette paper scars), 容易瘀傷(bruising), 關節鬆弛(joint laxity) 應考慮下列何種疾病?

- A. SHAMBERG'S DISEASE
- B. KAWASAKI'S DISEASE
- C. EHLERS - DANLOS SYNDROME
- D. 遲發性皮膚卟啉症(PORPHYRIA CUTANEA TARDA)
- E. 皮膚澱粉樣變性(AMYLOIDOSIS CUTIS)

(A) 158. 皮膚具有多項之功能, 其中之保護功能主要來自於:

- A. 角質層(Stratum corneum)
- B. 棘狀層(Stratum spinosum)
- C. 基底膜(Basement membrane)
- D. 真皮層(Dermis)
- E. 皮下組織(Subcutaneous tissue)

(D) 159. 以下何種疾患不會產生水 (vesicle)?

- A. 天 瘡(Pemphigus)
- B. 接觸性皮膚炎(Contact dermatitis)
- C. 多形性紅斑(Erythema multiforme)
- D. 克興氏病(Cushing's disease)
- E. 疹樣皮膚炎(Dermatitis herpetiformis)

(C) 160. 關於 Subacute cutaneous lupus (SCLE) 的敘述, 那一項為不正確?

- A. ANA 可能呈陰性反應
- B. 中樞神經及腎病不常見
- C. 很少出現 Anti-Ro (SSA) 抗體
- D. 皮膚變化可能為 Polycyclic annular lesions
- E. 皮膚變化可能為 Papulosquamous psoriasiform lesions

(D) 161. 關於尋常性天 瘡(pemphigus vulgaris) 何者為非?

- A. 棘層鬆解(acantholysis)
- B. Nikolsky's sign 陽性
- C. 常合併口腔內病變
- D. 免疫螢光抗體直接法檢查為陰性
- E. 病理檢查為表皮內水 (intra-epidermal vesicle)

(D) 162. Fish tank granuloma 最常由下列何種病菌所感染?

- A. Mycobacterium tuberculosis
- B. Mycobacterium kansasii

- C. *Mycobacterium ulcerans*
- D. *Mycobacterium marium*
- E. *Mycobacterium fortuitum*

(B) 163. 抗細胞間質抗體(Anti-intercellular substance antibody)出現於下列那一種皮膚水 疾病?
A. 疹狀皮膚炎(Dermatitis herpetiformis)
B. 尋常性天 瘡(Pemphigus vulgaris)
C. 類天 瘡(Pemphigoid)
D. 帶狀 疹(Herpes zoster)
E. 單純水 性表皮鬆解症(Epidermolysis bullosa simplex)

(D) 164. 下列何種情形會造成疤痕性脫毛(scarring alopecia)
A. 頭癬(tinea capitis)
B. 二期梅毒(secondary syphilis)
C. 終止期脫毛(telogen effluvium)
D. 扁平苔癬(lichen planus)
E. 脂漏性皮膚炎(seborrheic dermatitis)

(D) 165. 結節性硬化症(tuberous sclerosis)皮膚最早出現之症候為:
A. 臉部多發性血管纖維瘤(multiple angiofibroma of face)
B. 鮫皮樣斑塊(shagreen patch)
C. 甲圍纖維瘤(periungual fibroma)
D. 葉形白斑(Ash leaf hypopigmentation)
E. 甲下纖維瘤(subungual fibroma)

(D) 166. 下列何者不會造成紅皮症(erythroderma)?
A. 乾癬(psoriasis)
B. 毛孔性紅色 糠疹(pityriasis rubra pilaris)
C. 皮膚 T 細胞淋巴瘤(cutaneous T cell lymphoma)
D. 急性蕁麻疹(acute urticaria)
E. 脂漏性皮膚炎(seborrheic dermatitis)

(C) 167. HLA 抗原中,與乾癬(psoriasis)有關者為
A. B 11

- B.B 8
- C.B 13
- D.B 16
- E.B 19

(B) 168. 臨床上禿髮(Alopecia)可大致分為非癩痕性(Non-scarring)及癩痕性(scarring)禿髮,下列何者為癩痕性禿髮?

- A.圓禿(Alopecia areata)
- B.扁平苔癬(Lichen planus)
- C.終止期禿髮症(Telogen effluvium)
- D.二期梅毒之禿髮(Moth-eaten alopecia)
- E.雄性禿(Androgenic alopecia)

(A) 169. 你認為葯膏標示 Clobetasol propionate(Temouate 0.05% cream)是屬於那一 group 之 glucocorticoid preparation?

- A.group 1
- B.group 2
- C.group 3
- D.group 4
- E.group 5

(B) 170. 有關蕁麻疹 Urticaria 之陳述何者不對?

- A. 中央浮腫圍繞紅暈之暫時性皮炎
- B. Urticaria Pigmentosa 可引起蕁麻疹與 Eosinophil 有關
- C. 惡性腫瘤(Malignancy)可引起蕁麻疹
- D. 太陽光可引起蕁麻疹
- E. 蕁麻疹可有眼皮,口腔,咽喉部浮腫現象

(A) 171. 據在加護治療中心對心肌梗塞疾患的研究,發現那些病人最有可能活下來?

- A. 不希望死掉的人
- B. 對自己的疾病表現出最關心的人
- C. 對自己疾病的嚴重度有適當的焦慮表現的人
- D. 有 A 型人格特質的人
- E. 不需用或很少用鎮靜劑的人

(A) 172. 若一病患被帶至急診室時是處於昏迷(coma)狀態,而身上

有強烈的酒味,除其他基本的檢查外,下列何種實驗檢查是極需要的?

- A. Blood sugar
- B. CSF protein
- C. EEG
- D. Urinalysis
- E. T4

(B) 173. 憂鬱症患者那一種激素分泌過多?

- A. 甲狀腺激素
- B. 腎上腺皮質激素
- C. 性腺激素
- D. 生長激素
- E. 子宮收縮素

(E) 174. 有關於抗憂鬱劑(Antidepressant)的每日劑量,下列何者為是?

- a. Fluoxetine (Prozac) 20-80 mg
- b. Trazodon (Desyrel) 150-600 mg
- c. Maprotiline (Ludiomil) 50-225 mg
- d. Imipramine (Tofranil) 50-150 mg
- e. Doxepin (Sinequam) 150 mg

- A. a + b + c
- B. a + b
- C. b + c
- D. b + c + d + e
- E. a + b + c + d + e

(B) 175. 全國在大力掃盪毒品氾濫時,身為醫護人員對毒品應有警惕和認識。海洛因(Heroin)是台灣地區目前為害最鉅的一種毒品,有極強的成癮性,昂貴,使人傾家蕩產。下列敘述何者正確?

- A. 海洛因(Heroin)和古柯鹼(Cocaine)結構類似,作用也相近,戒斷症狀也相似。
- B. 海洛因(Heroin)和速賜康(Pentazocine),同屬於鴉片類成癮劑(Opioids)
- C. 海洛因成癮之戒斷症狀初期有噁心,腹瀉,流鼻水,流淚,起雞皮疙瘩等,約在停藥後 2-3 天出現

- D. 嚴重之戒斷症狀出現在停藥 5-6 天後,會有全身乏力,疼痛,煩躁,呵欠連連,視幻覺,被害妄想等
- E. 以上皆非

(E) 176. 對於急性躁動狀態(acute agitated state)的病人,其每天最高治療劑量,下列何者為非?

- A. Haloperidol (Haldol) 50 mg
- B. Fluphenazine (Anatensol) 10 mg
- C. Lorazepam (Ativan) 10 mg
- D. Thioridazine (Melleril) 800 mg
- E. Chlorpromazine (Wintermin) 100 mg

(E) 177. 關於 Clozapine (Clozaril), 下述何者錯誤?

- A. 主要用於治療慢性精神分裂病
- B. 對於其他抗精神病藥物治療無效的病人,仍有 30%對 Clozapine 有不錯的治療反應
- C. 藥物使用一年後,約有 2% 發生顆粒性血球缺乏症 (Agranulocytosis)
- D. 使用本藥物較少發生錐體外徑路症候群(Extrapyramidal syndrome)的副作用
- E. Clozapine 的藥理機轉具有較強的多巴胺阻斷作用 (Dopaminergic blocking effect)

(D) 178. 下列有關 HIV-infection 的精神症狀,何者為非?

- A. 痴呆(Dementia)
- B. 人格改變(Personality change)
- C. 缺乏主動(Lack of initiative)
- D. 其病理是相同的(pathologic substate is homogeneous)
- E. 過動(hyperactivity)

(E) 179. 下列何種實驗室測驗,在憂鬱症病人可能出現異常?

- A. Dexamethasone 壓抑試驗(Dexamethasone suppression test)
- B. TRH 試驗(TRH test)
- C. Insulin 耐受性試驗(Insulin tolerance test)
- D. Clonidine 對生長激素(growth hormone)的刺激試驗
- E. 以上皆是

- (B) 180. 截至目前為止, 典型及非典型抗精神病劑(antipsychotics)皆對下類何種典型的多巴胺接受器(dopamine receptor)具有阻斷作用?
- A. D1
 - B. D2
 - C. D3
 - D. D4
 - E. D5
- (B) 181. 邊緣性人格違常性別比率為
- A. 男多於女
 - B. 女多於男
 - C. 男女一樣多
 - D. 尚未定論
 - E. 青少年期前男多於女; 成年後女多於男
- (B) 182. 精神分裂病患者有那些症狀顯示預後較佳
- A. 逐漸發病
 - B. 明顯的情緒波動
 - C. 有家族病史
 - D. 早期發病
 - E. 持續幻聽
- (C) 183. 同卵雙胞胎(Monozygotic twin)的精神分裂病患者, 兩者都罹患精神分裂病的機率(coincidence)有多少?
- A. 20%
 - B. 40%
 - C. 60%
 - D. 80%
 - E. 100%
- (C) 184. 自殺患者在腦部神經傳導介質及其代謝產物中發現何種物質有明顯的改變?
- A. 正腎上腺素(norepinephrine)降低
 - B. 正腎上腺素(norepinephrine)增高
 - C. 血清促進素(serotonin)降低
 - D. 血清促進素(serotonin)增高
 - E. 多巴胺(dopamine)增高

- (D) 185. 抗精神病劑惡性症候群(Neuroleptic malignant syndrome)具有下列特徵,何者除外?
- A. 高燒
 - B. 意識障礙
 - C. 白血球增多
 - D. 血中 creatine phosphokinase (CPK)減低
 - E. 脈搏與血壓不穩
- (B) 186. 下列有關精神分裂病(Schizophrenia)的症狀,何者為非?
- A. 妄想(delusion)
 - B. 失定向感(disorientation)
 - C. 幻覺(hallucination)
 - D. 語無倫次(incoherent speech)
 - E. 誇大(grandiosity)
- (E) 187. 70 歲的慢性失眠男性病人,因意識模糊,小便失禁及胡言亂語而被送至急診。你應該立即採取何項處置?
- A. 詳細會談,以了解其人格特質及心理自衛機轉
 - B. 詢問病史,用藥情形,尤其是最後一次服藥時間及劑量
 - C. 做詳細之神經學,生化及血液檢查
 - D. (A),(B),(C)皆對
 - E. (B),(C)皆對
- (D) 188. 下列何種鎮靜劑可用來治療恐慌症?
- A. lorazepam(Ativan)
 - B. diazepam(Valium)
 - C. triazolam(Halcion)
 - D. alprazolam(Xanax)
 - E. chloridazepoxide(Librium)
- (B) 189. 下列何種症狀與精神分裂症之診斷無關?
- A. 幻聽
 - B. 幻視
 - C. 思想傳播
 - D. 病程超過六個月
 - E. 功能衰退

- (D) 190. 當 AIDS 患者產生憂鬱症但又呈現一些器質性精神症狀, 下列那種藥為最佳選擇?
- A. Thioridazine(Melleril)
 - B. Nortriptyline(Aventyl)
 - C. Lorazepam(Ativan)
 - D. Fluoxetine(Prozac)
 - E. Amitriptyline(Elavil)
- (E) 191. 當一名 50 歲以上之病人首次出現躁症症狀(manic symptoms)時, 醫師應考慮何種疾病?
- A. 藥物引起(drug-induced)
 - B. Viral encephalitis
 - C. hyperthyroidism
 - D. dialysis dementia syndrome
 - E. 以上皆對
- (C) 192. 下列何種疾病為老年痴呆症(dementia)之主要肇因?
- A. 精神分裂病(Schizophrenia)
 - B. 輕型憂鬱症(Neurotic Depression)
 - C. 阿滋罕默疾病(Alzheimer's Disease)
 - D. 酒精濫用(Alcohol Abuse)
 - E. 血管疾病(Vascular disease)
- (E) 193. 國內酒癮(Alcoholism)人口近來快速成長, 年齡也有下降的傾向。下列敘述何者不正確?
- A. 大量乙醇(Ethanol)對中樞神經系統(CNS)有抑制作用
 - B. 酒癮者, 可能會出現週邊末梢神經病變(Peripheral Neuropathy)原因可能是 Vit B1(Thiamine)缺乏所致
 - C. 酒癮者減少飲酒量或戒酒不喝後, 常出現手抖, 心跳, 呼吸加快, 失眠, 坐立難安等戒斷症狀
 - D. 酒精戒斷症候群, 大多在數天後會逐漸好轉; 少數患者出現意識混亂, 顫抖不安, 幻覺, 胡言亂語, 妄想等, 此即震顫性譫妄(Delirium tremens)
 - E. 以上皆正確
- (D) 194. 下列何種藥物與躁症症狀(manic-like symptoms)相關?
- A. Glucocorticoids and adrenocorticotrophic hormone (ACTH)

- B. Propranolol and Reserpine
- C. Cocaine and Amphetamines
- D. (A) and (C)
- E. (A) and (B)

(E) 195. 譫妄(delirium)為器質性腦症候群常見症狀,有關於譫妄之臨床特徵,下列何者為非?

- A. 意識溷濁(clouding of consciousness)
- B. 定向感障礙
- C. 記憶障礙
- D. 病情在一天內有很大的波動
- E. 病程一般均超過一星期

(C) 196. 焦慮性疾患(Anxiety disorders)的特徵是:

- A. 有現實感喪失
- B. 有幻聽或幻視的症狀
- C. 有焦慮及伴隨焦慮所產生的逃避行為
- D. 有意識障礙現象
- E. 以上皆正確

(E) 197. 恐慌發作(panic attack)是急診處常見的疾病,下列何種藥物可誘發類似發作?

- A. 乳酸鹽(lactate)
- B. 育亨賓(yohimbine)
- C. 咖啡因(caffeine)
- D. benzodiazepine 反向催動劑(inverse agonist)
- E. 以上皆可

(C) 198. 下列何者不是鋰鹽中毒(lithium intoxication)的徵候(sign)?

- A. 共濟失調(ataxia)
- B. 口齒不清(dysarthria)
- C. 欣快感(euphoria)
- D. 眼球震顫(nystagmus)
- E. 嘔吐(vomiting)

(D) 199. 關於抗精神病藥物誘發的遲發性運動困難(Tardive Dyskinesia),下述何者錯誤?

- A. 年老女性患者發生此症的危險機率最高
- B. 注射長效抗精神病藥針劑比口服藥劑的危險性高
- C. 致病機轉可能與多巴胺接受體被阻斷後引起接受體超過敏反應有關,所以增加抗精神病藥物劑量,可以暫時緩解症狀
- D. 用抗膽素激發性藥物(Anticholinergic drugs)治療有效
- E. Reserpine 可以達到有效的症狀治療

(D) 200. 三環類抗憂鬱劑(Tricyclic Antidepressants)在臨床上使用於憂鬱症和強迫症(Obsessive Compulsive Disorder)的患者,對此類藥物常見副作用的敘述,那一項是錯誤的?

- A. 口乾(Dry mouth)
- B. 便秘(Constipation)
- C. 尿液滯留(Urinary retention)
- D. 高血壓危機(Hypertensive crisis)
- E. 視力不清(Blurred Vision)

(E) 201. 下列那項疾患不適用於生理迴饋治療(biofeedback treatment)?

- A. 癲癇
- B. 高血壓
- C. 緊張性頭痛
- D. 心律不整
- E. 退化性關節炎

(C) 202. 下列有關於神經性厭食症(Anorexia Nervosa),何者為非?

- A. 病人自行誘發體重減輕(self-induced weight loss)
- B. 以白種,年輕女性為多
- C. 無遺傳傾向
- D. 在住院病人中死亡率達 6%
- E. 體重須比正常體重低 15%,診斷才成立