

流感疫苗不良反應及處置經驗分享

李育軒主任

下營區衛生所

1) 流感疫苗的安全性

- 25~50%可能發生注射部位疼痛、紅腫
- 1~2%會出現發燒、虛弱等全身性反應
- 嚴重的反應如 Guillain-Barre syndrome 發生率在百萬分之1
以下
- 對於 Egg-protein 有立即型過敏反應、患有發燒等急性病症及
六個月以下幼兒（免疫效果較差）等，不適合接種

2) 流感疫苗安全嗎？

- 每年台灣有數百萬人接種流感疫苗
- 疫苗與其他任何藥品一樣有可能造成副作用
 - 較常見的副作用為全身性的輕微反應（發燒、頭痛、肌肉酸痛、皮膚疹……）
 - 嚴重的副作用（立即型過敏反應、神經系統症狀、血液系統症狀……）比例極低
- 台灣已有完整的疫苗安全監測系統與受害救濟制度

3) 接種後嚴重疫苗不良事件通報與處理

➤ 接種後嚴重疫苗不良事件

- ✓ **定義**：包括死亡、危及生命、造成永久性殘疾或傷害、導致病人住院、延長已住院病人住院時間、或胎兒先天畸形者等
- ✓ **通報流程**：若有發現個案，應詳填「流感疫苗接種嚴重疫苗不良事件通報單」**立即**通報衛生局或全國藥物不良反應通報中心(ADR)
 - 填寫說明，可參考全國藥物不良反應通報中心「上市後疫苗不良事件通報表填寫指引」
- ✓ **處理流程**：配合進行個案病情狀況等相關調查，並提供個案必要之醫療協助。

嚴重不良事件通報結果選項：

- (1) **死亡**：只有在您懷疑或無法排除通報個案的死亡與接種疫苗的關聯具合理可能性時勾選此選項。
- (2) **危及生命**：指在疫苗不良事件發生時，病人處於極大的死亡風險之狀況。並非指疫苗不良事件在理論上當嚴重度加重後可能會造成死亡之事件。
- (3) **造成永久性殘疾**：指疫苗不良事件導致一般人正常生活的能力

受到極大的損傷。為疫苗不良事件導致具臨床意義之持續性或永久性的身體功能、結構、日常活動或生活品質的改變、障礙、傷害或破壞。

(4) 胎嬰兒先天性畸形：懷疑因懷孕期間與接種疫苗有關之先天性畸形。

(5) 導致病人住院或延長病人住院時間：指當疫苗不良事件導致病人住院或延長住院時間。急診處置或急診留觀並不屬於住院的一種，請參考「其他嚴重不良事件(具重要臨床意義之事件)」部分說明。

(6) 其他嚴重不良事件(具重要臨床意義之事件)：指當疫苗不良事件並不造成前述之後果，但其本質可能會對於病患的安全造成危害並且需要額外的治療來預防發展至前述結果之疾病狀況時，請勾選此選項。例如：過敏性的氣管痙攣需要急診室的處理解除症狀；癲癇發作但不需要住院處理；顏面神經麻痺但不需要住院處理等。

(7) 非嚴重不良事件：非前述後果之案件者。

4) 疫苗的爭議 -1) 暈針事件.

2) 急性瀰散性腦脊髓炎 (ADEM, acute disseminated encephalomyelitis).

總結

- 感染流感後可能發生併發症或導致死亡
- 高風險族群出現類流感症狀時建議儘早使用抗病毒藥物治療

- 接種流感疫苗能夠降低罹患流感及產生後續併發症的風險
- 接種流感疫苗出現嚴重副作用的比例極低
- 發現嚴重疫苗不良事件請儘速通報